

Traitements topiques sous ordonnance

Suivez les instructions de votre fournisseur de soins de santé pour l'application de la médication. Avisez votre médecin si vous ressentez de l'inconfort ou un malaise inhabituel. Si possible, appliquez les traitements topiques seulement sur les lésions de psoriasis pour éviter d'irriter la peau qui n'est pas atteinte.

Médication Nom usuel (Marque)	Comment agit-elle?	Comment est-elle administrée?	Dose & Fréquence	Suivi	*Effets secondaires communs
Corticostéroïdes ex. béméthasone mométasone	Réduisent l'inflammation (enflure et rougeur, desquamation) de la peau	Appliqués sur la peau	Une à deux fois par jour selon la médication	Suivi possible de la fonction de la glande surrénale	Peau fragile et amincie, prône aux ecchymoses. Apparition de petits vaisseaux sanguins. Bandes de peau minces, rouges qui se changent en fines lignes (vergetures) Infection des follicules pileux Taches rouges ou violettes Dermatite de contact (éruption) Susceptibilité aux infections Croissance pileuse
Dérivés/Analogues de la Vitamine D – Calcipotriol. (Dovonex®) – Calcitriol (Silkis®)	Ramène la croissance des cellules de la peau à la normale	Appliqués sur la peau	Deux fois par jour (matin et soir) sur la peau atteinte	Suivi des niveaux de calcium	Brûlures, démangeaisons, enflure, peau qui pèle, sécheresse et éruptions
Combinaison topique de traitements (Vit. D plus corticostéroïdes) – Calcipotriol + bétaméthasone (Dovobet®) Enstilar®)	Agit pour ramener la croissance des cellules de la peau à la normale. Réduit l'inflammation (rougeurs, enflures et démangeaisons).	Appliquée sur la peau.	Appliquer sur la peau une fois par jour. Jusqu'à 4 à 8 semaines selon la médication et telle que prescrite par le médecin.	Suivi des niveaux de calcium et de la fonction de la glande surrénale	Faibles démangeaisons et effets secondaires listés précédemment qui sont associés aux ingrédients individuels.
Rétinoïdes – Tazarotène (Tazorac®)	Agit pour ramener la croissance des cellules de la peau à la normale. Et effets anti-inflammatoires.	Appliqués sur la peau.	Appliquer en couche mince une fois par jour au coucher sur la peau atteinte. Continuer le traitement comme prescrit par le médecin.	Tel que déterminé par le médecin. Éviter les grossesses durant le traitement.	Brûlures et rougeurs de la peau Démangeaisons et irritation de la peau Inflammation et douleur à la peau Peau qui pèle Aggravation du psoriasis Eczéma, éruptions Sensation de picotement de la peau

Ces renseignements proviennent des monographies complètes des produits ou des renseignements pour les consommateurs de chacune des médications énumérées précédemment. *Ce tableau ne fournit pas la liste complète des effets secondaires possibles.

Pour des renseignements détaillés, référez-vous à la monographie du produit — réactions indésirables ou au feuillet de renseignements pour le consommateur qui traitent des mises en garde, précautions et autres considérations pour chacun des traitements.